






위치	오류유형	수정 전	수정 후
112~112p 번호 : 29	문제-본문	단일 슬릿 실험에서 사용한 빛의 파장이 $6,000\text{\AA}$ 일 때, 두 번째 어두운 무늬가 나타나는 지점에서의 경로차는 얼마인가?	단일 슬릿 실험에서 사용한 빛의 파장이 $6,000\text{\AA}$ 일 때, 두 번째 밝은 무늬가 나타나는 지점에서의 경로차는 얼마인가?

위치	오류유형	수정 전		수정 후	
112~112p 번호 : 29	문제-본문	수정 전	단 슬릿의 어두운 무늬 경로차	 에서	
		수정 후	단 슬릿의 밝은 무늬 경로차		

위치	오류유형	수정 전	수정 후
113~113p 번호 : 34	문제-보기(지문)	수정 전	Image not found or type unknown 
		수정 후	Image not found or type unknown 

위치	오류유형	수정 전	수정 후
113~113p 번호 : 34	문제-본문	수정 전	Image not found or type unknown 
		수정 후	Image not found or type unknown 

위치	오류유형	수정 전	수정 후
----	------	------	------

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.