위치	오류유형	수정 전	수정 후
책 속의 책 158p 번호 : 90	문제-보기(지문)	① ㉠ : 3.42, ㉡ : 9, ㉢ : 0.18, ㉣ : 6.33 ① ㉠ : 3.42, ㉡ : 10, ㉢ : 0.17, ㉣ : 6.71 ① ㉠ : 3.42, ㉡ : 9, ㉢ : 0.18, ㉣ : 6.33 ① ㉠ : 3.42, ㉡ : 10, ㉢ : 0.17, ㉣ : 6.71	① ㉠ : 3.42, ㉡ : 9, ㉢ : 0.18, ㉣ : 6.33 ② ㉠ : 3.42, ㉡ : 10, ㉢ : 0.17, ㉣ : 6.71 ③ ㉠ : 3.42, ㉡ : 9, ㉢ : 0.18, ㉣ : 1.04 ④ ㉠ : 6.74, ㉡ : 10, ㉢ : 0.17, ㉣ : 6.71
책 속의 책 160p 번호 : 96	문제-본문	없음	[연령별 정당의 선호도 분할표] 아래에 삽입 [카이제곱 검정] 구 분 / 값 / 자유도 / 점근유의확률(양쪽검정) Pearson 카이제곱 / 91.3412 / 4 / 0.000 우도비 / 93.347 / 4 / 0.000 선형대 선형결합 / 3.056 / 1 / 0.080 유효 케이스 / 940 / /
200p 번호 : 28	오타	① 표본크기 결정 → 모집단 확정 → 표본틀 결정 → 포본추출방법 결정 → 표본추출 ② 모집단 확정 → 표본크기 결정 → 표본틀 결정 → 포본추출방법 결정 → 표본추출 ③ 모집단 확정 → 표본틀 결정 → 포본추출방법 결정 → 표본크기 결정 → 표본추출 ④ 표본틀 결정 → 모집단 확정 → 표본크기 결정 → 포본추출방법 결정 → 표본추출	① 표본크기 결정 → 모집단 확정 → 표본틀 결정 → 표본추출방법 결정 → 표본추출 ② 모집단 확정 → 표본크기 결정 → 표본틀 결정 → 표본추출방법 결정 → 표본추출 ③ 모집단 확정 → 표본틀 결정 → 표본추출방법 결정 → 표본크기 결정 → 표본추출 ④ 표본틀 결정 → 모집단 확정 → 표본크기 결정 → 표본추출방법 결정 → 표본추출
362p 번호 : 27	오타	도수분포가 비대칭이고 극단치들이 있을 때보다 적절한 중심성향 척도는?	도수분포가 비대칭이고 극단치들이 있을 때, 보다 적절한 중심성향 척도는?

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.