위치	오류유형	수정 전	수정 후																				
책 속의 책 158p 번호 : 90	문제-보기(지문)	① ㉠ : 3.42, ㉡ : 9, ㉢ : 0.18, ㉣ : 6.33 ① ㉠ : 3.42, ㉡ : 10, ㉢ : 0.17, ㉣ : 6.71 ① ㉠ : 3.42, ㉡ : 9, ㉢ : 0.18, ㉣ : 6.33 ① ㉠ : 3.42, ㉡ : 10, ㉢ : 0.17, ㉣ : 6.71	① ㉠ : 3.42, ㉡ : 9, ㉢ : 0.18, ㉣ : 6.33 ② ㉠ : 3.42, ㉡ : 10, ㉢ : 0.17, ㉣ : 6.71 ③ ㉠ : 3.42, ㉡ : 9, ㉢ : 0.18, ㉣ : 1.04 ④ ㉠ : 6.74, ㉡ : 10, ㉢ : 0.17, ㉣ : 6.71																				
책 속의 책 160p 번호 : 96	문제-본문	없음	[연령별 정당의 선호도 분할표] 아래에 삽입 [카이제곱 검정] <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>값</th> <th>자유도</th> <th>점근유의확률(양쪽검정)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pearson 카이제곱</td> <td>91.3412</td> <td>4</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>우도비</td> <td>93.347</td> <td>4</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>선형대 선형결합</td> <td>3.056</td> <td>1</td> <td>0.080</td> </tr> <tr> <td>유효 케이스</td> <td>940</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구 분	값	자유도	점근유의확률(양쪽검정)	Pearson 카이제곱	91.3412	4	0.000	우도비	93.347	4	0.000	선형대 선형결합	3.056	1	0.080	유효 케이스	940		
구 분	값	자유도	점근유의확률(양쪽검정)																				
Pearson 카이제곱	91.3412	4	0.000																				
우도비	93.347	4	0.000																				
선형대 선형결합	3.056	1	0.080																				
유효 케이스	940																						
200p 번호 : 28	오타	① 표본크기 결정 → 모집단 확정 → 표본틀 결정 → 표본추출방법 결정 → 표본추출 ② 모집단 확정 → 표본크기 결정 → 표본틀 결정 → 표본추출방법 결정 → 표본추출 ③ 모집단 확정 → 표본틀 결정 → 표본추출방법 결정 → 표본크기 결정 → 표본추출 ④ 표본틀 결정 → 모집단 확정 → 표본크기 결정 → 표본추출방법 결정 → 표본추출	① 표본크기 결정 → 모집단 확정 → 표본틀 결정 → 표본추출방법 결정 → 표본추출 ② 모집단 확정 → 표본크기 결정 → 표본틀 결정 → 표본추출방법 결정 → 표본추출 ③ 모집단 확정 → 표본틀 결정 → 표본추출방법 결정 → 표본크기 결정 → 표본추출 ④ 표본틀 결정 → 모집단 확정 → 표본크기 결정 → 표본추출방법 결정 → 표본추출																				
362p 번호 : 27	오타	도수분포가 비대칭이고 극단치들이 있을 때보다 적절한 중심성향 척도는?	도수분포가 비대칭이고 극단치들이 있을 때, 보다 적절한 중심성향 척도는?																				

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
 더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.