

위치	오류유형	수정 전	수정 후
10p 10~11줄	개념,공식-설명	·자식성작물 : 벼, 밀, 보리, 귀리, 기장, 수수, 토마토, 상추, 완두, 강낭콩, 스위트피, 가지, 고추, 오이, 호박, 수박, 참두, 금어초, 셀비어, 담배, 아마, 참깨 등	·자식성작물 : 벼, 밀, 보리, 귀리, 기장, 수수, 토마토, 상추, 완두, 강낭콩, 스위트피, 가지, 고추, 참두, 금어초, 셀비어, 담배, 아마, 참깨 등
45p 번호 : 40	정답	한쪽 면에 종자로 된 매트로 종자 유실방지, 종자의 발아와 정착에 바람직한 환경을 제공하기 위해 제작된 것을 말한다.	발아의 환경조건이 적당함에도 불구하고 종자가 발아하지 않는 현상을 말한다.
48p 번호 : 51	문제-본문	(0.002~1.0% / 1.0~2.0%)	(0.02~1.0% / 1.0~2.0%)
111p 번호 : 86	문제-본문	5~6매, 8~9매	3~5매, 8~9매
242p 번호 : 63	문제-본문	$\frac{16 + 45 + 120 + 77 + 8 + 9}{50} = 5.5\text{일}$	$(16+65+120+77+8+9)/50=5.9\text{일}$
310p 번호 : 15	문제-문항	15 벼, 옥수수, 콩 종자수분검사 시 수분함량으로 적합한 것을 고르시오. ·벼의 종자수분검사 시 적합한 수분함량은 (13~17% / 17~23% / 23~30%) 이다. ·옥수수의 종자수분검사 시 적합한 수분함량은 (7% / 14% / 18%) 이다. ·콩의 종자수분검사 시 적합한 수분함량은 (7~10% / 13~18% / 20~25%) 이다.	15 벼, 옥수수, 콩 수확 적기의 수분함량으로 적합한 것을 고르시오. ·벼의 적합한 수분함량은 (13~17% / 17~23% / 23~30%) 이다. ·콩의 적합한 수분함량은 (7% / 14% / 18%) 이다. ·옥수수의 적합한 수분함량은 (7~10% / 13~18% / 20~25%) 이다.
323p 번호 : 18	정답	·가지과 : 첫 화방이 나오는 시기가 적당하다. ·박과 : 3~5번째 본엽이 나올 때가 적당하다.	·가지과 : 본잎이 2~3장 정도 나온 시기에 가식 ·박과 : 떡잎 출현 후 가식
328p 번호 : 13	정답	① 하배축, ② 자엽(떡잎), ③ 유근	① 하배축, ② 유근, ③ 자엽(떡잎)

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.